



6. Solanka.

6. Solanka.

Zraje od polou srpna do počátku září.

Česká hruška, u nás značně rozšířená, prostřední velikosti; bývá až 11 cm dlouhá, 7 cm široká, podlouhlého tvaru.

Kalich jest polo neb zcela otevřený, v mělké lubolaté jamce neb sedí na povrchu plodu, vzniklá žebra táhnou se ploše přes plod, takže jej mírně hranatí.

Stopka jest spíše kratší a silná, bývá obyčejně se strany do zhrbolené špičky plodu vláčna, často bradavičkami posetá.

Slupka jest hladká, zelená, v plné zralosti žlutá, někdy na slunci zardělá, pokrytá hustými tečkami, mistry i rzí.

Dužnina jest bělavá, hojně šfavnatá, jemná, sladce navinulé, aromatické chuti.

Jádrínek jest dutoosý, komory střední, v nich málo vyvinutá jádra.

Češe se as v polou srpna, pro místní spotřebu koncem srpna; jsou v té době sladké a velice chutné.

Strom roste zdravě, tvoří širší vznosnou korunu, umožňuje i pěstování při širších cestách; hodí se jako vysokokmen do polních a domácích sadů. Přimo na kdouli roste dobře a slibně, avšak často se stává, že celý zákrssek i s ovocem se ve šlechtěném místě vylomí; proto lépe povíztí mezišlechtění. Plodí později, střídavě velmi hojně. Pro tvary, které vyžadují přísný řez, se nehodí, neb řez silných letorostů činí oblíže a osvědčuje se tudíž k pěstování jako keřový zákrssek.

Daří se nejlépe v hluboké hlinité půdě, v těžších náplavách; roste i v půdách horších, nedocíluje se však té velikosti a chuti. Zajímavé jest, že tvar plodů mění se podle povahy půdy; vůči polohám není choulostivá, má býti však před větry chráněná.

Opylovací schopnost není dosud prozkoumána. Špatné vlastnosti: Dřevo není dosti tvrdé; mladé letorosty rády namrzají. Pro tvarované stromy má nevhodný vzrůst, který jest závadou k rozšíření.

Upotřebení: Pro trh se češe předčasně, doprava ve tvrdém stavu snáší velmi dobře a vydrží 3—4 týdny aniž by hniličila. Jest důležitou vývozní a obchodní hruškou, dobře placenou a oblíbenou.

Synonyma: Solaner Birne, Poire de Solany.