



6. Black Ben

6. Black Ben.

Zraje v březnu, vydrží do července.

Americké jablko, dosti veliké (průměrně 250 gr.), téměř kulovitého, krásně pravidelného tvaru; průměrná výška bývá asi 75 mm, šířka 80 mm.

Kalich jest pootevřený neb zcela zavřený, v široké, mírně hluboké, hrubě zvlněné jamce. Úšty jsou dlouhé, šedé.

Stopka u normálních plodů jest kratší a silnější. Jamka stopečná jest širší, mělká, rzivá; rez přechází v korkovinu, která někdy objeví se i na slupce.

Slupka jest lesklá, základní barvy žluté, která pouze v zastíněných místech proniká; celý povrch jest na sluneční straně tmavě, jinak světle červeně pokryt.

Dužnina jest žlutavá, jemná a šfavnatá, aromatická, sladce navinulé chuti.

Sklízí se co nejpozději; k jídlu dospívá v dubnu, vydrží do nových jablek, nevadne ani nehnije, každá rána zaschne a dále se nekazí.

Strom roste zdravě, bujně, tvoří úhledné, pravidelné, jehlancovité koruny, které umožňují pěstování i ve stromořadích.

Zákrsky šlechtí se na dužén, pro živné půdy a menší tvary na jánče.

Řez snáší dobře, vedoucí výhony nutno řezati kratčěji a napomáhat zářezy, aby spodní očka vyrašila.

Půdy vyžaduje živné, jabloňové, přiměřeně vlhké, spokojí se i s půdami horšími. Polohy snáší i vysoké (540 m nad mořem). Libuje si v polohách s vlhčím ovzduším.

Květy jsou vůči mrazům odolné; kvete pozdě. Plodí velice záhy ovoce téměř stejné velikosti, které drží pevně na stromech. Úrodnost jest hojná a pravidelná. Dopravu snáší bezvadně, řadí se mezi nejvýnosnější odrůdy.

Jest dobrým opylovačem.

Špatné vlastnosti: Škůdcům vzdoruje, jedině v chudých půdách a v suchém létě trpí fusidniem, jest proto nutný postřik bordóskou jíchou.

Upotřebení: Za čisté plody docíljuje se vysokých cen. Jest to výborné tržní, tabulové a hospodářské ovoce.