

7. CIKÁNKA.

PŮVOD buď v Estonsku nebo v Rusku.

VELIKOST prostřední až velká, váha 200—225 g; výška asi 75 mm, šířka 75 mm, také výška 64 mm, šířka 84 mm.

TVAR měnlivý; bývá zploštělý i vyšší, celkově nepravidelný, zřejmě žebnatý až zhrnatý.

KALICH je uzavřený, úšty kališní vzpřímené, plstnaté, jamka kališní menší, na okraji zhrbolená.

STOPKA je krátká, tlustá, v úzké, hluboké jamce, kterou nepřesahuje.

SLUPKA hladká, lesklá, mastná, voní; základní barva zelenavě žlutá, z větší části pokryta růžovou barvou, na sluneční straně přechází do tmavě červené barvy, místy jsou temnější pruhy; v červení jsou četné, drobné, bělavé tečky, zvláště husté kolem kalichu. U plodů, vystavených plnému slunci, jest slupka temně červená až hnědě červená, pruhy téměř černé.

DUŽNINA jest žlutavá, řídká, hrubozrnná, příjemně navinulá, mírně aromatické chuti. Na stromě přezrálé jsou bezcenné.

JÁDŘINEC dosti veliký, cibulovitý. Rourka kališní spojena s dutou osou jádřincovou. Jádřové komory jsou dosti velké, 13:26 mm, s hustě a pravidelně popraskanými stěnami; vůči ose jádřincové jsou uzavřené. **JÁDRA** jsou početná, podlouhlá, špičatá, světle hnědá.

ZRAJE v polovině srpna, vydrží v chladu 14 dní, sklízí se v neúplné zralosti. Cenová skupina II. b.

STROM roste na zákrskových podnožích prostředně bujně, zdravě; je velmi otužilý, záhy plodný a neobyčejně úrodný, čímž ve vzrůstu ochabuje a nedostatečně živen, krní. Ideální odrůda pro zákrskové stromy na E. M. II, IV a pro nejmenší tvary (svislé kordony, větvenovité kordony a pod.) na E. M. IX; plodnost je zaručena i téměř bez řezu.

ŠPATNÉ VLASTNOSTI: Zraje v době, kdy je dostatek hodnotnějších odrůd.

UPOTŘEBENÍ: U nás má význam pro domácí zahrádky. V Holandsku jest prvotřídní obchodní odrůdou.

SYNONYMA: Zigeunerin-Apfel, La Zingarella.



7. Cikánka