

## 17. DOBERÁNSKÁ RENETA.

**PŮVOD** v Německu (Meklenbursko), velmi stará odrůda.

**VELIKOST** je prostřední, váha asi 180—200 g; výška asi 67 mm, šířka 80 mm.

**TVAR** je ploše kulovitý nebo zakulaceně kuželovitý, největší šířka uprostřed plodu.

**KALICH** je otevřený, úšty malé, částečně vzpřímené, vzájemně se nedotýkající, v pěkné, pravidelné, normálně veliké a hluboké jamce.

**STOPKA** je tenká, krátká, sotva přes okraj jamky přesahující, hnědavá; jamka je pravidelná, nálevkovitá, rezovitá. Rez přesahuje i přes okraj jamky a po celém povrchu jsou dosti velké rezovité tečky nebo i skvrny, anebo husté kmínovité čárky.

**SLUPKA** je drsná, lesklá a pevná. Základní barva je zelenavě žlutá, z větší části je povrch hnědokarmínový, jen zastíněná plocha jest žlutozelená nebo slabě červená. Nevoní.

**DUŽNINA** je bělavě žlutá, jemnozrná, šťavnatá, výtečné, mírně nasládlé, příjemně aromatické chuti, připomínající Orleánskou renetu. Nevoní.

**JÁDRINEC** je poměrně malý, cibulovitý; osa jádřincová je široká, dutá, vůči komorám mírně otevřená, spojená s rourkou kališní. Jádrové komory jsou malé, s mírně popraskanými stěnami. **JÁDRA** četná, malá, krátká, málo plná, tmavohnědá.

**SKLÍZÍ SE** pozdě, uzrává v listopadu, vydrží do března i déle.

**STROM** roste bujně, tvoří široce plochou korunu s vodovnými větvemi. Vůči chorobám a škůdcům značně odolný, mšice krvavá jej však nevynechává. Větve i letorosty se křížují, vyžaduje občasný průklest. Pro pravidelně řezané zákrskové stromy se nedoporučuje a pěstuje se nejčastěji jako vysokokmen nebo volně rostoucí zákrsek. Plodí poněkud později, potom dosti pravidelně, uspokojivě, ne však příliš.

**JEST DOBRÝM PYLODÁRCEM.**

**KVETE POZDĚ.**

**ŠPATNÉ VLASTNOSTI:** V suché místnosti rychle vadne.

**UPOTŘEBENÍ:** Prvotřídní stolní odrůda. Cen. skup. I. c.

**SYNONYMA:** Doberánská míšeň, Doberánská reneta míšeňská, Doberaner Borsdorfer Reinette, Doberaner Reinette.



17. Doberánská reneta