

77. FROGMORSKÉ.

PŮVOD v Anglii.

VELIKOST: váha 200—250 g; výška 68 mm, šířka 90 mm.

TVAR ploše kulovitý, ke kalichu více zúžený, zpravidla nesouměrný.

KALICH šedý, poměrně malý, pootevřený nebo otevřený. Jamka dosti široká, přiměřeně hluboká, drobnými hrbolky zvlněná. Na okraji jamky vystupují někdy silná žebra, šíří se ploše přes celý plod, mizí v jamce stopečné, čímž plod mírně hranatí.

STOPKA poměrně tenká, až 38 mm dlouhá, v pravidelné, nálevkovité, hluboké a úplně rezovité jamce.

SLUPKA mdle lesklá, na omak mastná, hladká, žlutavě zelená, na sluneční straně lehce hnědočerveně ožehlá, někdy i se znatelnějšími, mírně červenými pruhy. Příjemně voní.

DUŽNINA čistě bílá, šťavnatá, velmi jemná, kyprá, lahodné, nepatrně kořeněné chuti.

JÁDRINEC malý, protáhlý, jádrové komory dosti velké, stěny dosti popraskané. JÁDRA jsou nepočtená, krátká, dosti plná, tmavě hnědá.

SKLÍZÍ SE od poloviny září, protrhává se, postupně dospívá, později sčesané vydrží do prosince i déle. Nevadné.

STROM má sporý vzrůst, korunu má rozloženou a téměř za všech podmínek jest pravidelně a hojně úrodný. Nejvhodnější jsou zákrskové stromy na E. M. IV a I, malé tvary na E. M. IX; plodí v celých chomáčích, často tak, že jest nutná probírka plodů. Občasným zmlazením se napomáhá vzrůstu, květné puky se vytvářejí téměř bez řezu. Prospívá i ve vyšší poloze; v suché půdě jsou plody drobné, nechutné. Přihnojování jest nutné.

KVETE prostředně záhy, doba květenství jest dosti dlouhá, květy jsou značně otužilé.

DOBŘE VLASTNOSTI: Netrpí chorobami ani škůdci.

UPOTŘEBENÍ: Řadí se mezi odrůdy hospodářsky významné, zvláště do domácích zahrad, kde se více počítá s hojností nežli jakostí ovoce. Cenová skupina II. b.

SYNONYMA: Frogmorské úrodné, Frogmore prolific, Fertile de Frogmore, Fruchtbarer von Frogmore.



77. Frogmorské