

ADAMOVSKE

Synonyma: Adamovo sládě, Adamovské sládě, Funtové, Koryčanky, Koryčanské, Panenské sladké.

Výskyt: roztroušeně na Slovácku, Hané i Valašsku.

Tvar: vysoce kulovitý, nepravidelný, polovina plodu je vždy menší, od kalichu zkosená, tupá žebra plod deformují.

Velikost: střední, výška 55 mm, šířka 58 mm, hmotnost 70–75 gramů.

Stopka: silná, hnědá, dlouhá maximálně 20 mm, většinou mírně přečnívá z jamky. Stopečná jamka je širší, středně hluboká, částečně rzivá s náznakem svalce.

Kalich: menší až střední, pootevřený, téměř bez podkališní rourky. Ušty jsou plstnaté, vztyčené, konce olámané nebo nazpět ohnuté. Jamka je středně hluboká, široká, výrazně hrboilatá a částečně rzivá.

Slupka: tuhá, slabě lesklá, v nezralém stavu trávově nazelenalá. Je překrytá mramorováním nebo žíháním hnědočervené barvy. Osluněná strana vytváří výrazné matně hnědočervené líčko intenzivně pokryté bílými lenticelami. Při dozrání se barva mění do oranžova.

Dužnina: nažloutlá s mírně nazelenalými svazky cévnými. Jádřínek je střední velikosti s nevelkými pouzdry se dvěma špičatými, tmavohnědými semeny. Chuť je sladká, s mírně renetovou příchutí.

Zralost: nastupuje v říjnu, na skládce vydrží i do jara.

Poznámka: Plody jsou odolné vůči chorobám a poškození při transportu. Na skladování nejsou náročné. Je to vhodná odrůda k přímému konzumu i ke zpracování. Strom roste zdravě a dosti bujně i v méně příznivých podmínkách. Pod výrazy „adamovo“, „adamovské bílé“, „adamovské červené“, „adamy“ apod. se vyskytují mnohé místní semenáče. Někteří ovocnáři označují odrůdu 'Adamsova parména' mylně synonymem Adamova parména. V Bludově na severní Moravě byla nalezena letní, červenoplodá odrůda a v roce 1940 popsána a nazvána 'Adamovo'.

