

BARYNÁČ**Synonyma:** Barnáč, Barináč.**Výskyt:** Hornácko.**Tvar:** kulovitý někdy i válcovitě elip-tický, ke stopce více zúžený, plod je nejširší v horní, kališní třetině, k jedné straně je sražený.**Velikost:** střední, výška 60 mm, šířka 63 mm, hmotnost 110–150 gramů.**Stopka:** krátká, kolem 10 mm dlouhá, tlustá až 4 mm, dřevnatá, hnědá až hnědočervená. Přesahuje úzkou, středně hlubokou, mírně rzivou stopečnou jamku.**Kalich:** malý, uzavřený, ušty úzké, vzprímené, špičky nazpět ohnuté, zasychají a lámou se. Kališní jamka je středně velká a náhle se zužuje. Je drobně žebertaná, nepravidelná. Obkališí je zvlněné se širokými a plochými žebry.**Slupka:** pevná, málo lámavá, hladká, není mastná, tmavě karmínově zbarvená, u zastíněných částí plodů světle karmínová. Slupka je poseta bílými lenticelami, u některých plodů se vyskytují bradavičky. Ojínění je středně intenzivní.**Dužnina:** žlutavě bílá, tuhá, na vzduchu hnědne, středně šťavnatá. Chuti je navinulé, průměrné. Jádřínek je srdčitý, středně široký, umístěný v kališní části. Stěny komor jádřínce občas praskají. Semena bývají vyvinutá, barvy tmavohnědé.**Zralost:** ke konzumu dospívá v prosinci a vydrží, dle uskladnění, do jara.**Poznámka:** Zimní odrůda průměrné chuti s tuhou dužninou. Je vhodná k přímému konzumu i na sušení. Je líbivého, méně obvyklého tvaru, barvy tmavě hnědočervené. Strupovitost jabloně se vyskytuje jen v letech se silným infekčním tlakem.