

ČAPÁK

Dle ovocnářské a etnografické literatury se tato odrůda vyskytovala v Brumově, Střelné a byla rozšířena na jižním Valašsku. Na Zlínsku byl výskyt písemně doložen z konce 19. století. Plody jsou plochého (čapatého), nestejně široce hranatého tvaru. Velikost je střední až větší, značně variabilní, průměrná výška 50 mm, šířka 66 mm, hmotnost kolem 100–120 gramů. Stopka je velmi krátká ve středně hluboké jamce, která se široce do třetiny plodu rozevívá. Je paprskovitě rzivá, někdy s načervenalými trhanými pruhy. Kalich je malý, uzavřený, ušty k sobě na bázi přiléhají, většinou jsou vzpřímené a lámavé. Kališní jamka je drobně hrbolatá. Obkališí je středně široké, hrbolaté, nestejně vysoké. Slupku má tenkou, pevnou, mírně mastnou. Základní barva je zelenavě žlutá, alespoň z třetiny až poloviny plodu na osluněné straně přerušovaně karmínově žíhaná. Na povrchu se nepravidelně vyskytují jemné rzivé skvrny a malé řídké hnědavé lenticely. Dužnina je nažloutlá, tuhá, ale jemná, mírně šťavnatá, na vzduchu hnědne až po dlouhé době. Jádřínek je dutoosý, menší, cibulovitěho tvaru, stěny komor popraskané, semena málo vyvinutá. Chuť je kyselá, někdy nahorklá, podprůměrná. Jedná se o raně zimní odrůdu, která na skládce vydrží do vánoc, někdy i déle.

TETERA, Václav a kolektiv. Ovoce Bílých karpát. Veselí na Moravě: Český svaz ochránců přírody, 2006.