

99. ANNA SPÄTHOVÁ.

Původ německý, vypěstovaná firmou L. Späth v Berlíně.

Velikost bývá prostřední, asi 4½ cm dlouhá, 4 cm široká, váží asi 55 g.

Tvar je kulovitý, poněkud protáhle oválný, z obou konců mírně stlačený; mělký žlábek dělí plod na dvě stejnoměrné polovice a se strany, kde se táhne, je plod mírně stlačený, jinak celkově pravidelný.

Stopka tenká, asi 2 cm dlouhá, v úzké nálevkovité jamce, je asi 2 mm do plodu zapuštěná.

Slupka je červená s hnědomodravým odstínem, v plné zralosti červenavě modrá. Po celém plodu prozáží tečkovaně světlá zeleň, tečky jsou nestejně velikosti, bývají i značně velké, hrubé, jeví se i jako čárky až 1 mm dlouhé. Také bývají po slupce rzivé, šupinaté skvrny. V místě po čnělce je žlutavá tečka.

Dužnina zelenavě žlutá, také zlatě žlutá, hojně šfavnatá, bývá silně vláknitá; vlákna jdou paprskovitě a jsou zvláště znatelná kolem pecky. Chuť velmi sladká, mírně, avšak znatelně navinulá, kořeněná. Od pecky se neodlučuje vždy stejně, v chladném létě značně k této lne.

Pecka je dlouhá, zašpičatělá, málo vydutá. Oblý hřbet má hladký, ostrý, tupě půlený.

Zraje většinou koncem září a počátkem října, údobí zrání se dosti protáhne.


Strom roste zdravě, tvoří řídkou, rozložitou korunu; rodí záhy, úrodnost je stálá. Vyžaduje živné teplé půdy i polohy.

Je samosprašná. Kvete prostředně pozdě.

Špatné vlastnosti: V nevhodném stanovišti neuspokojí, ovoce zůstává bez chuti; celkově je to náročná odrůda.

Upotřebení: Je dobrá k jídlu, vhodná k výsadbě domácí zahrádky; vzhledem k pozdní zralosti lze ji doporučit tam, kde je čilá poptávka po ovoci a není obava před konkurencí jádrového ovoce.

Synonyma: Anna Späth.



99. Anna Späthová