



2. Rychlice německá

2. Rychlice německá.

Původu jest neznámého.

Tmavá srdcovka, malá, většinou stejného tvaru; ojediněle mívá téměř více zašpičatělé, povrch je mírně a drobně zhrbolený. Ze stopečné jamky se táhne tmavá čára, která plod dělí na dvě téměř stejné polovice.

Plod jest asi 20 mm vysoký, 22 mm široký, 10 kusů váží 40—50 g.

Stopka jest as 4—5 cm dlouhá, v široké, dosti hluboké jamce a připojuje se na krátkou, kostrbatou pastopku.

Slupka jest jemná, velmi lesklá, temně červenohnědá; tuto prosvítají jemné pihy. Na trhu objevuje se již nezralá, když se »zapaluje« a jest ještě nepatrně červená.

Dužnina jest polotuhá, jemná, rudá, nemá mnoho šťávy, při plné zralosti jest velmi chutná; předčasně otrhaná jest chuti bezvýrazné.

Uzrává v první třetině června (podle stanoviště), červenati začíná počátkem června, dozrává postupně, zraje as v polou června, v I. týdnu třešňovém.

Kvete záhy.

Strom roste dosti bujně, rozvětňuje se nepravidelně ve vysokou menší korunu, větve se mírně sklánějí. Daří se nejlépe v lehčí, hlinité, dostatečně vápenité a vlhké půdě. Zvláště prospívá na výslunných svazích. Ploditi začíná velmi záhy, úroda jest hojná a stálá. Při šlechtění jest nutný pečlivý výběr roubov.

Špatné vlastnosti: Jest náročná na půdu; nemá-li příznivé podmínky, pak strom zakrňuje, trpí klejotokem a odumírá. Při květenství jest choulostivá, při nedostatečném oplození bývá mnoho plodů špatně vyvinutých, zvláště pecky a jádra nebývají vyspělé. V deštích puká.

Upotřebení: Kde se daří, jest pro svoji ranost velice výnosnou odrůdou. Lze ji doporučiti jen tam, kde není lepších místních neb krajových odrůd.

Synonyma: Frühste der Mark, Précocé de la Marche, Marchijska (pol.). Nejranější z kraje, Raná z Marcky, Kupperova raná, Pravlovka, Niemiecka wezešna a velmi mnoho jiných.